TAVOLA H3

MACCHIE E BOSCHI DI LECCIO
Habitat (ex allegato 1 Direttiva 92/43)
6310, 9340

- Macchia bassa del Quercetalia ilicis con strato arbustivo a dominanza di Q. ilex e individui sparsi di Pinus pinaster e Ampelodesmos mauritanica (6310 x 5332)
- Macchia bassa a Erica arborea, Arbutus unedo e Quercus ilex (6310 MATORRAL_DI_LECCIO)
- Macchia bassa del Quercetalia ilicis a dominanza di Quercus ilex (=6310)
- Macchia di Quercus ilex riferibile a Quercetalia ilicis in ambito di pineta a Pinus pinaster (3540 x 6310; 3540 x 9340)
- Bosco o boscaglia di leccio (Virbunum quercetum ilicis) in aspetti relativamente mesofili (9340)
- Bosco misto di leccio e conifere (Viburno - Quercetum ilicis) con Quercus ilex e Pinus halepensis (Quercetum ilicis e Pinetorum halepensis) (9340 x 9540)
- Bosco o boscaglia di leccio (Viburno-Quercetum ilicis) in aspetti relativamente mesofili su colture abbandonate di cui risultano ancora evidenze (9340)
- Bosco o boscaglia di leccio (Viburno - Quercetum ilicis) in aspetti realtivamente termofili (9340)
- Bosco misto mesofilo e submesofilo per lo più a dominanza di carpino nero (Quercetalia pubescentis) in aspetto misto di Quercus ilex, Ostrya carpinifolia e Fraxinus ornus
- Bosco misto di pino marittimo (Pinus pinaster) e carpino nero (Ostrya carpinifolia) con significativa presenza di roverella (Quercus pubescens) e leccio (Quercus ilex) talora su colture abbandonate di cui risultano evidenze
- Perimetro S.I.C. nel comune di Santa Margherita Ligure
- Confine comunale

P.U.C. SANTA MARGHERITA LIGURE
VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Scala 1:10000