TAVOLA H4

BOSCHI DI CASTAGNO
BOSCHI CON ROVERELLA E CINTURE RIPARIE AD ONTANO
Habitat (ex allegato 1 Direttiva 92/43) 9260, 91H0, 91E0

- Mosaici di boschi cedui di castagno con significativa presenza di leccio (Q. ilex) e boschi relativamente mesofili di Q. ilex (Habitat 9260 x 9340)
- Boschi cedui di castagno in purezza o quasi (Habitat 9260)
- Bosco ceduo di castagno con significativa presenza di carpino nero (Ostrya carpinifolia) talora su terrazzamenti abbandonati (Habitat 9260)
- Castagneto da frutto abbandonato (Habitat 9260)
- Castagneto da frutto abbandonato con Quercus pubescens
- Bosco misto di Ostrya carpinifolia con significativa presenza di Quercus pubescens e bosco ceduo di castagno con significativa presenza di Ostrya carpinifolia (Habitat 9260 + 91H0)
- Boschi cedui di castagno con significativa presenza di roverella (Quercus pubescens) e talora carpino nero (Ostrya carpinifolia) (Habitat 9260 + 91H0)
- Boschi cedui di castagno con significativa presenza di Ostrya carpinifolia misti a boschi cedui di castagno con significativa presenza di roverella (Quercus pubescens) (Habitat 9260 + 91H0)
- Bosco misto mesofilo a dominanza di carpino nero (Ostrya carpinifolia) con significativa presenza di roverella (Q. pubescens) talora su terrazzamenti abbandonati ancora evidenti (Habitat 91H0ROVERELLA)
- Bosco ceduo di Castanea sativa con significativa presenza di Ostrya carpinifolia e Quercus ilex
- Residui di boscaglia riparia ad ontano nero (Alnus glutinosa) (Habitat 91E0RESIDUI_RIPARI)
- Perimetro del S.I.C. nel comune di Santa Margherita Ligure
- Confine comunale

P.U.C. SANTA MARGHERITA LIGURE
VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Scala 1:10000