


dt1 Coltri detritiche di versante. Coltri detritiche eluvio -colluviali fini con spessori con spessore maggiore di 3,00m. [*Olocene*].

dt2 Coltri detritiche di versante. Coltri detritiche eluvio -colluviali medio grossolane con spessore maggiore di 3,00m. [*Olocene*].

a Alluvioni non terrazzate. ghiaoso-sabbioso-limose, non alterate in superficie, e depositi di spiaggia correlati con spessore maggiore di 3,00m.[*Olocene*].

ar FLUVIALE RECENTE LIGURE. Alluvioni del versante ligure, costituenti i terrazzi inferiori, ghiaoso-sabbiose, poco alterate in superficie con spessore maggiore di 3,00m.[*Pleistocene*].

aa FLUVIALE ANTICO LIGURE. Depositi ghiaiosi talora molto grossolani, poligenici (anche con ciottoli di cristallino) e sabbie, lungo la costa ligure, di deposizione fluviale o marina, localmente molto alterati in superficie. Coltri più o meno potenti di materiali fortemente alterati con spessore maggiore di 3,00m. [*Pleistocene antico (?) - Pliocene superiore (?)*].

ca cg ma CALCARE DI FINALE LIGURE (FIN). Calcari vacuolari bioclastici a coralli e codiacee, di colore bianco, rosato o rossastro, con intercalazioni di arenarie in strati e lenti, massicci nella parte superiore, ben stratificati in quella inferiore (ca); marne biancastre a frattura concoide (ma); alternanze di conglomerati poligenici ed arenarie (cg). [*Serravalliano (?) - Miocene prelanghiano (?)*].

cb FIN COMPLESSO DI BASE DEL CALCARE DI FINALE LIGURE. Sabbie quarzose grossolane, brecce monogeniche dolomitiche, conglomerati alternati a sabbie, marne più o meno argillose, di colore grigio giallastro [*Miocene Prelanghiano(?) - Oligocene inferiore (?)*].

ca TAN CALCARE DI VAL TANARELLO. Calcari marmorei chiari, ceroidi, ben stratificati; localmente alla base, calcari arenacei e conglomerati; alla sommità, talora, marmi rosati e mandorlati [*Maim*].

do SPM DOLOMIE DI SAN PIETRO DEI MONTI. Dolomie più o meno calcaree grigie, in grosse bancate; alternanze di calcari e calcari dolomitici grigi e con intertrati pelitici rossi e verdi; localmente, calcari chiari o rosati, ceroidi, alternati a strati dolomitici; livelli di brecce calcaree e dolomitiche intraformazionali; calcari dolomitici a piste; calcari micacei chiari, scistosi, calcari silicei e dolomie con noduli di selce [*Ladinico - Anisico*].

qz PTN QUARZITI DI PONTE DI NAVA. Quarziti biancastre e verdoline, per lo più a grana grossa, in strati e banchi, a volte scistose e cloritiche, con rare peliti verdi e violacee intercalate verso la sommità [*Scitico*].

Faglie

150/35 Giacitura della stratificazione

LIMITE COMUNALE

PROVINCIA DI SAVONA

REGIONE LIGURIA

COMUNE DI BORGIO VEREZZI

PIANO URBANISTICO COMUNALE

COMMITTENTE	COMUNE DI BORGIO VEREZZI
PROGETTISTI	ARCH. BRUNO GABRIELLI ARCH. FEDERICA ALCOZER ARCH. ROBERTO BURLANDO ARCH. PIETRO COZZANI
STUDI GEOLOGICI	GEOL. GIOVANNI BATTISTA PIACENTINO GEOM. GIUSEPPE PIACENTINO - collaboratore
STUDI AGROFORESTALI	

DOCUMENTO			
TAVOLA G 1	CARTA GEOLOGICA		
FORMATO	FILE ELABORAZIONE	FILE DI STAMPA	SCALA 1:5000

REV.	DATA	DESCRIZIONE E REVISIONE	ELABORAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE