
COMUNE DI AMEGLIA
provincia della spezia

PIANO DEGLI ARENILI E DELLA FASCIA COSTIERA

STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA L.R. 24/87
zone PRG - "D4" e "D5", costa di Fiumaretta e Bocca di Magra

procedura V.A.S. - LR 32/12



COMUNE DI AMEGLIA
Andrea DE RANIERI
Sindaco
Nicoletta GIANGARE'
Architetto - RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

REDAZIONE DEL PIANO
Antonio CHIRICO
prof. Ingegnere
Via P. Toselli 11/11 - 16142 GENOVA
tel. 010 354877 Email: chiriant@unige.it

Doriano LUCCHESINI
Architetto
Via C. Arzelà, 7 -19037 S. STEFANO MAGRA
tel. 0187 630041 Email: apua@studioapua.com

GEOLOGIA
Giovanni RATTI
Doriano CAPUTO
Geologo
Via Ratti, 6A 19030 AMEGLIA
tel. 348.9226718 Email: dorianocaputo@libero.it

aspetti ambientali ed agronomici
Gabriella COZZANI
Dott. Agronomo
Via della Stazione 9bis - VEZZANO LIGURE (SP)
tel. 3337804876 Email: gaya76@virgilio.it

COLLABORAZIONI
Arch. Elisabetta BECAGLI, Michele CONTI, Arch Francesco CONTI, Elisa LOMBARDI, Ing. Elisa TORTI, Ing. Lucia PICASSO

TITOLO ELAB.	**STUDIO D'INCIDENZA Tavole Allegate**		
DATA ELAB.	**13-10-15**	*REVISIONE* A	*SCALA*


REV.	*DESCRIZIONE*	*DATA*
A	1 emissione per ADOZIONE	Ott 15
B		
C		
D		


ELABORATO Nr.

INC 02


Rilievo della vegetazione stato attuale zona Sergiunca spiagge Marinella

TAV. 01





















detriti spiaggia

Parcheggio su piana incolta

Zona iris pseudocorus, Juncus sp., Gladiolus sp., Equisetum sp.

Ficus carica, Pinus pinea, Eucalyptus sp., Nerium oleander

Sito puntuale Crithumum maritimum

campo da calcio

Piana coltivata presenza nelle scoline di piante tipiche zone umide e Arundo donax

Tamererix sp. associate a piante arbustive Euonymus japonica,Parthenocissus quiquefolia, Trachelospermum jasminoides

Tamarix spp. con siepi di Pittosporum tobira

Associazione di diversi alberi Popolus spp. , Robinia pseudoacacia, Cupressus sempervirens, Ailanthus altissima, Cycas revoluta

Bordura con piante arbustive Laurus nobilis, Pittosporum tobira, Euonymus japonica, Parthenocissus quiquefolia, Trachelospermum jasminoides

Infestanti: Bromus sp., Hordeum sp.,Cynodon dactylon, Silene vulgaris

Arundo donax

Sergiunca area incolta con scoline

Fossi secondari di scolo acque con presenza sparsa di juncus sp, Iris pseudocorus, Gladiolus sp., Harundo donax, Equisetum sp., Mentha aquatica,

Filari di Pinus pinea

Rilievo della vegetazione stato attuale Bocca di Magra




foto 1



foto 2












La vegetazione presente varia da specie erbaceo arbustive autoctone come Cistus sp. (foto 1), Sambucus nigra, Smilex aspera, Quercus ilex, Arbutus unedo, Pistacia lentiscus, Pinus marittima e Pinus pinea a specie invasive come Robinia pseudoacacia e Ailanthus altissima. Si segnala la presenza di specie alloctone ornamentali come Phoneix canariensis (foto 2). Il sottobosco si mostra in diversi punti impenetrabile e di difficile accesso.


fiumaretta
bocca di magra


Porticciolo
Villa
Romana
Marittima
AR.3
AR.4a
AR.4b
AR.5
bocca di magra


TAV. 03
P2
PPE.4
P1
PPE.5
Vrs
PPE.3
P3
PP.2
SB2.1
AR.01
AR.02
SB2.2
SB1.2
SB1.1
SB2.3
UI.02
UI.01
AB.1
UR1.1
UR1.2
UR1.3
UR 1
UR1.4
UR1.5
AB.2
fiumaretta
Legenda
Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba
Habitat caratterizzati da canneti
Habitat costieri di interfaccia tra ecosistemi marini e spiaggia
Aree insediative diverse
Habitat agricoli prevalentemente olivo in coltura
Aree insediative diverse Habitat forestali a gravitazione mediterranea di latifoglie sempreverdi
Habitat boschivi di latifoglie
Habitat dei fondali duri tra il sopra litorale e infralitorale delle scogliere con vegetazione delle coste mediterranee
scogliere con limonium spp. endemici
Ecomosaici agricoli eterogenei ,geosigmeti dei corsi d'acqua mediterranei a flusso permanente e delle relative alluvionali con vegetazione nitrofila erbacea e fasce riparie di salice e pioppo bianco, corsi intermittenti e relativa vegetazione di greto, pascoli inondati mediterranei, fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodium rubri p.p. e Bidention p.p, fiumi mediterranei a flusso intermittente con Paspalo Agrostidion